

Infekcija se
NE može preneti:



druženjem sa
inficiranom
ili obolelom
osobom



rukovanjem



zagrljajem



kašljanjem ili
kijanjem



kupanjem u
bazenu



putovanjem,
boravkom i
spavanjem u
zajedničkoj
prostoriji



korišćenjem
zajedničkog
toaleta



preko pribora
za jelo



ubodom
insekata.



BEOSUPPORT

Dragoslava Popovića 11a

Tel: 011 3343 560


email: beosup@eunet.yu

website: www.beosupport.co.yu

HIV i AIDS

HIV - virus humane imuno-
deficijencije slabi imunološku
otpornost organizma i
sprečava ga da se bori protiv
različitih (virusnih, bakterij-
skih, gljivičnih i proto-
zoalnih) infekcija.

AIDS/SIDA — sindrom
stečene imunodeficijencije je
poslednji i najteži stadijum
infekcije HIV virusom.



Dijagnoza **HIV** infekcije se postavlja isključivo primenom specifičnih testova za otkrivanje HIV virusa. Zaražena osoba se fizički ni po čemu ne razlikuje od zdrave osobe.

Dijagnoza **AIDS**-a se postavlja na osnovu kliničkih simptoma i znakova oboljenja, kao i laboratorijskih pokazatelja ošteđenja imuniteta (CD-4 limfocita).

HIV infekcija može trajati od nekoliko meseci do više godina i uvek se završava bolešću AIDS-om.

Oboleloj osobi se terapijom može produžiti život, ali za sada izlečenja nema.

Zato nam jedino ostaje da ne dozvolimo da dođe do infekcije.

Infekcija se može preneti:



• polnim kontaktom



• inficiranom krvlju ili proizvodima krvi



sa majke na dete tokom:
• trudnoće...



• porođaja...



• dojenja

Bez obzira na pol i uzrast, svi smo ugroženi od ove infekcije, ali najviše osobe koje se rizično ponašaju. Rizikom se smatra:



• često menjanje partnera



bez upotrebe kondoma



• upotreba tuđeg pribora prilikom korišćenja narkotika



• povredom predmeta koji su zaraženi svežom inficiranom krvju